

## INFOKAART

Longfunctie onderzoek diagnostisch via Star-shl	
Organisatie	Star-shl
Onderdeel	Aanvragen diagnostiek Spirometrie
Type	Regulier
Beschrijving	Bij verdenking van astma en/of COPD kunt u een diagnostische spirometrie aanvragen. Deze wordt conform de NHG-standaard /CAHAG richtlijnen uitgevoerd. Naast het spirometrie onderzoek worden de anamnese, leefstijl en vragenlijsten afgenomen. Dit is van belang voor een juiste interpretatie van de resultaten en adviesvorming door de beoordelend longarts of kaderhuisarts astma/COPD. U ontvangt de digitale resultaten binnen 5 werkdagen per Edifact. Aanvullend ontvangt u de flow/volumecurve per post.
Criteria	<p><b>Indicaties</b> Diagnostische spirometrie bij verdenking van astma en/of COPD.</p> <p><b>Contra-indicaties</b> Absolute contra-indicaties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Myocard infarct minder dan een maand voorafgaand aan het onderzoek.</li> <li>• Buik- of oogoperatie minder dan 6 weken voorafgaand aan het onderzoek.</li> </ul> <p>De relatieve contra-indicaties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pijn op de borst of in de buikstreek (ongeacht de oorzaak).</li> <li>• Pijn in of aan de mond of het gezicht die door het mondstuk verergerd wordt.</li> <li>• Recente exacerbatie (&lt; 6 weken geleden)*.</li> <li>• Stress incontinentie.</li> <li>• Dementie of verwardheid.</li> </ul> <p>* Om een vertekend beeld te voorkomen, wordt geadviseerd dit onderzoek niet binnen 6 weken na een longaanval uit te voeren. Indien de spirometrie toch tijdens de behandeling met antibiotica of prednison moet worden uitgevoerd is het advies dit duidelijk bij de aanvraag te vermelden.</p>
Leeftijd	De minimum leeftijd voor dit onderzoek is 16 jaar.
Verwijs- of consultatiemiddel	Zorgdomein Diagnostiek Longfunctieonderzoek Spirometrie <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnostische spirometrie (code FL12)</li> </ul>
Vorbereiding huisartsenpraktijk	Voorafgaand aan het onderzoek de eigen inhalatiemedicatie laten staken <ul style="list-style-type: none"> <li>• SABA, SAMA of combinatie hiervan: stop 8 uur voor het onderzoek</li> <li>• LABA, LAMA, ICS of combinatie hiervan: stop 24-48 uur voor het onderzoek (afhankelijk van werkingsduur)</li> </ul> Patiëntinformatie <a href="https://star-shl.nl">Spirometrie (longfunctieonderzoek) (star-shl.nl)</a>
Aanwijzingen huisartsenpraktijk	Vul het aanvraagformulier via ZorgDomein. volledig in. In sommige gevallen wordt gevraagd naar belangrijke aanvullende informatie, zoals huidige medicatie, voorgeschiedenis en/of allergieën. Deze informatie is nodig voor de adequate beoordeling van de onderzoeksvraag.
Aanvullende diagnostiek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Histamine provocatietest (FL15) <a href="https://star-shl.nl">Histamineprovocatietest (star-shl.nl)</a></li> </ul>

Kosten	Diagnostisch longfunctieonderzoek wordt gefactureerd conform het <a href="#">NZA Tarieven (star-shl.nl)</a> BVT/FO en vergoed door de zorgverzekeraar met in achtneming van het eigen risico .
--------	--